

## Histoire Familiale de Cancer Et Risque De Dépression chez le Sujet Âgé Cancéreux

*I. Hachaichi (1)*  
*L. Ghanmi (2)*  
*F. Sagar (1)*  
*S. Sghaier (3)*  
*A. Ben Hmida (4)*  
*H. Hsine (3)*  
*Z. Ghodhbane (3)*  
*S. Salah (3)*  
*L. Chenik (5)*  
*Y. Ammar (6)*  
*S. Aloulou (4)*

(1) Groupement de santé de Base Ghannouch. Gabes (Tunisie).  
(2) Service de psychiatrie, Hôpital Régional de Gabès (Tunisie).  
(3) Hôpital de circonscription de Wedhref. (Tunisie).  
(4) Service de carcinologie médicale, Hôpital Régional de Gabès (Tunisie).  
(5) Unité médicale du centre des personnes âgées à Gammarth (Tunisie).  
(6) Hopital de Zarzis (Tunisie).

**Citation:** I. Hachaichi, L. Ghanmi, F. Sagar, S. Sghaier, A. Ben Hmida, H. Hsine, Z. Ghodhbane, S. Salah, L. Chenik, Y. Ammar, S. Aloulou. Histoire Familiale de Cancer Et Risque De Dépression chez le Sujet Âgé Cancéreux. Middle East Journal of Age and Ageing, Volume 15, Issue 2, June 2018. DOI: 10.5742/MEJAA.2018.93403

### ABSTRACT

**Objectif:** Mesurer la prévalence de la dépression chez le sujet âgé cancéreux et rechercher l'existence d'un lien avec l'histoire familiale du patient.

**Patients et Méthodes:** Nous avons mené une étude transversale descriptive et analytique auprès des patients âgés de plus de 65 ans, souffrant d'une pathologie cancéreuse et qui ne présentaient pas des troubles cognitifs, consultant durant l'année 2013 au service de carcinologie de l'hôpital régional de Gabès. Nous avons utilisé une fiche de renseignement regroupant les données sociodémographiques, cliniques et psychologiques du patient. Nous avons utilisé aussi l'échelle de dépression gériatrique (GDS) validée en Tunisie, pour évaluer la dépression. Tout patient inclus dans l'étude a fait l'objet d'une double évaluation d'abord oncologique puis psychiatrique. L'évaluation oncologique était assurée par le même médecin oncologue senior pour tous les patients. L'évaluation psychologique a été faite par un entretien psychiatrique semi-directif avec le patient et au moins un membre de sa famille, conduit par un médecin psychiatre senior. Tous les patients ont été évalués par le même psychiatre.

**Résultats:** 60 patients cancéreux répondaient aux critères d'inclusion. L'histoire familiale des patients était marquée par la présence de cas de cancer (33,3%) et de décès par cancer (30%). Chez les malades étudiés, la prévalence de la dépression était de 48%. La dépression était significativement associée à la présence d'une histoire familiale de décès suite à un cancer (72% vs 38%,  $p=0.01$ ).

**Conclusion:** Une relation existerait entre l'histoire familiale de décès par cancer et le risque de dépression chez le sujet âgé cancéreux.