

Caractéristiques du cancer et risque de dépression chez le sujet âgé cancéreux

L Ghanmi (1,4)

R Boukhchina (1)

MH Aoun (1)

K Zitoun (1)

Mouna Abbes (1)

F Sagr (2)

I Hachaichi (2)

Aicha Ben Hmida (3)

Samir Aloulou (3,4)

(1) Service de psychiatrie, Hôpital Régional de Gabès (Tunisie)

(2) Centre de Soins de Santé de Base de Ghannouch, Gabès (Tunisie)

(3) Service de carcinologie médicale, Hôpital Régional de Gabès (Tunisie)

(4) Faculté de Médecine de Sfax

Citation: L Ghanmi, R Boukhchina, MH Aoun, K Zitoun, Mouna Abbes, F Sagr, I Hachaichi, Aicha Ben Hmida, Samir Aloulou. Caractéristiques du cancer et risque de dépression chez le sujet âgé cancéreux. Middle East Journal of Age and Ageing, Volume 15, Issue 2, June 2018. DOI: 10.5742/MEJAA.2018.93407

ABSTRACT

Objectif: Mesurer la prévalence de la dépression chez le sujet âgé cancéreux et rechercher les caractéristiques cliniques du cancer associés à la dépression.

Patients et Méthodes: Il s'agit d'une étude transversale, descriptive et analytique, qui a inclus les patients âgés de plus de 65 ans, souffrant d'une pathologie cancéreuse et qui ne présentaient pas de troubles cognitifs, consultant durant l'année 2013 au service de carcinologie de l'hôpital régional Gabès. Nous avons utilisé une fiche de renseignement regroupant les données sociodémographiques, cliniques et thérapeutiques du patient. Pour évaluer la dépression, nous avons utilisé l'échelle de dépression gériatrique (GDS) validée en Tunisie. Les patients ont été évalués sur le plan oncologique puis psychiatrique. L'évaluation oncologique était assurée par le même médecin oncologue senior pour tous les patients. L'évaluation psychologique a été faite par un entretien psychiatrique semi-directif avec le patient et au moins un membre de sa famille, conduit par un médecin psychiatre senior. Tous les patients ont été évalués par le même psychiatre.

Résultats: 60 patients cancéreux répondaient aux critères d'inclusion. L'âge moyen était de 75 ans. Parmi les patients, 63% étaient des hommes et 72% étaient mariés. 52% des patients étaient déjà métastatiques au moment du diagnostic. Chez les malades étudiés, la prévalence de la dépression était de 48%. La dépression était significativement associée à la présence de métastases (75% vs 25%, $p=0.02$), de fatigue (62% vs 26%, $p=0.007$) et de douleur (59% vs 29%, $p=0.02$).

Conclusion: Des facteurs modifiables sont associés à la dépression chez le sujet âgé cancéreux, notamment la douleur. Une attention particulière doit être prêtée à ces facteurs lors de la prise en charge de ces malades.