

Diabète de l'âge: Handicap, Dépendance et Qualité de Vie

Sghaier S. (1)
Ghodhbane Z. (1)
Salha S. (1)
Hessine H. (2)
Hachaichi I. (3)
Sagar F. (3)
Amorri F. (4)
Ghanmi L. (4)

(1) *Oudhref Constituency Hospital, Tunisia*
(2) *Service nephrology hospital hedi chaker sfax, Tunisia*
(3) *Ghanouche Hospital, Tunisia*
(4) *Gabes Regional Hospital, Tunisia*

Citation: Sghaier S., Ghodhbane Z., Salha S., Hsine H., Hachaichi I, Sagar F., Amorri F., Ghanmi L.. Diabète de l'âge: Handicap, Dépendance et Qualité de Vie. Middle East Journal of Age and Ageing, Volume 15, Issue 2, June 2018.
DOI: 10.5742/MEJAA.2018.93415

ABSTRACT

Introduction: Chez le sujet âgé, la poly pathologie et la poly médication sont des facteurs fréquents d'accidents iatrogènes médicamenteux (AIM). Notre étude a estimé la prévalence des AIM, les symptômes et les médicaments incriminés chez des sujets âgés suivis à notre hôpital.

Méthodes: Il s'agit d'une étude rétrospective durant 2016/2017, 120 patients ont été inclus. le nombre et le type de médicaments, le statut fonctionnel et nutritionnel, la mobilité, l'humeur, les déficits neurosensoriels et la cognition ont été recherchés.

Résultats: Notre étude a montré que 48 (40 %) des patients âgées de 82 ± 4 ans ont présenté des AIM. le sexe féminin est dominant, Les principales classes incriminées sont les médicaments cardiovasculaires (16.6 %), les psychotropes (25 %) et anti-infectieux (12.5 %), les anti-inflammatoires (50%), étaient les plus fréquemment incriminés. Les symptômes les plus fréquents étaient l'hypotension orthostatique (31.25 %), les troubles digestifs (50 %) et les troubles neuropsychiques (12.5 %).

Conclusion: Le risque iatrogène médicamenteux dans la population est un réel problème de santé publique. Sa réalité a été appréciée et confirmée par les études épidémiologiques comme un phénomène non négligeable et source d'hospitalisation et de mortalité, le consensus est établi pour affirmer que la fragilité des sujets dans ses dimensions médico-psycho-sociales est en cause. Il existe une iatrogénie évitable sur laquelle tous les efforts de prévention doivent porter. Cette dernière passe par la prise de conscience de tous les professionnels, leur formation et par une information adaptée des patients âgés.